

---

## DIAGNOSTYKA, RADIOLOGIA

■ 1. Wskaż informacje dotyczące badania pacjenta zawierające się w wywiadzie ogólnym.

- 1) Uczulenia na środki znieczulenia miejscowego.
- 2) Uczulenie na penicylinę.
- 3) Schorzenia współistniejące, np. wirusowe zapalenie wątroby.
- 4) Skłonność do przedłużającego się krwawienia.
- 5) Użytki, np. papierosy.

**A) 1, 2, 3   B) 3, 4   C) 3, 4, 5   D) 2, 3, 4   E) Wszystkie wymienione**

■ 2. W badaniu przedmiotowym miejscowym zewnątrzustnym ocenia się:

- 1) staw skroniowo-żuchwowy.
- 2) nerwy czaszkowe.
- 3) węzły chłonne.
- 4) szyję.

**A) Tylko 1   B) 1, 3   C) Tylko 4   D) 1, 3, 4   E) Wszystkie wymienione**

■ 3. Badanie nerwów czaszkowych, w tym istotnego z punktu widzenia lekarza dentystry nerwu trójdzielnego, polega na ocenie uciskowej jego zakończeń w otworach:

- A) nadoczodołowych i podoczodołowych.**
- B) nadoczodołowych, podoczodołowych i bródkowych.**
- C) nadoczodołowych, podoczodołowych i na wyrostku rylcowatym.**
- D) nadoczodołowych, podoczodołowych i na wyrostku sutkowatym.**
- E) Żadne z powyższych.**

4. Ile stopni ma wskaźnik anamnestyczny dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych według Helkimo?

- A) Dwa.
- B) Trzy.
- C) Cztery.
- D) Pięć.
- E) Sześć.

5. Węzły chłonne podbródkowe zbierają chłonkę z zębów:

- A) 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44.
- B) 33, 32, 31, 41, 42, 43.
- C) 32, 31, 41, 42.
- D) 32, 31, 41, 42, 12, 11, 21, 22.
- E) 33, 32, 31, 41, 42, 43, 13, 12, 11, 21, 22, 23.

6. Wybierz objawy, które ocenia wskaźnik kliniczny dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych według Helkimo.

- 1) Ból podczas ruchów żuchwy.
- 2) Występowanie krwiałków w okolicy głów stawowych.
- 3) Amplituda ruchów żuchwy.
- 4) Ból mięśni podczas badania palpacyjnego wewnątrzustnego.

A) 1, 2, 3, 4   B) 1, 2   C) 3, 4   D) 1, 3, 4   E) 2, 4

7. Węzły chłonne podżuchwowe dzielą się na:

- A) dwie grupy węzłów: I i II.
- B) trzy grupy węzłów: A, B, C.
- C) cztery grupy węzłów: 1, 2, 3, 4.
- D) pięć grup węzłów: a, b, c, d, e.
- E) Żadne z powyższych.

■ 8. Jak nazywamy zjawisko odciągania brzegu dziąsła przy ruchach wargi?

- A) Zespół pociągania.
- B) Puff.
- C) Pull syndrom.
- D) Prawidłowe są odpowiedzi A + B.
- E) Prawidłowe są odpowiedzi A + C.

■ 9. W klasyfikacji wędzidełek wargi górnej i dolnego według Placka przyczep wędzidełka, który zlokalizowany jest na brodawce międzyzębowej, oznaczamy jako:

- A) V.
- B) IV.
- C) III.
- D) II.
- E) I.

■ 10. Chłonkę z zęba 16. zbierają węzły chłonne:

- A) podbródkowe.
- B) podżuchwowe grupy A.
- C) podżuchwowe grupy A i B.
- D) podżuchwowe grupy B i C.
- E) Prawidłowe są odpowiedzi A + D.

■ 11. W badaniu testem elektrycznym najniższy próg pobudliwości będą miały:

- A) zęby sieczne.
- B) kły.
- C) zęby przedtrzonowe.
- D) zęby trzonowe.
- E) Próg pobudliwości będzie taki sam dla różnych grup zębowych u konkretnego pacjenta.

12. Badanie cytologiczne polega na ocenie cech morfologicznych komórek, które są pobrane metodą złuszczenia z powierzchni zmiany. Do takiego badania kwalifikują się zmiany z uszkodzoną powierzchnią na błonie śluzowej. Jest jednak od tego wyjątek, wskaż jaki.

- A) Leukoplakia.
- B) Liszaj płaski.
- C) Choroba Bowena.
- D) Erytroplakia.
- E) Owrzodzenia.

13. Wybierz spośród poniższych przeciwwskazania do pobierania wycinków.

- 1) Powierzchnowe naczyniaki krwionośne.
- 2) Małe guzki możliwe do usunięcia w całości.
- 3) Plamy przebarwione na ciemno, które znikają pod wpływem ucisku.

A) 1, 2, 3   B) 2, 3   C) Tylko 2   D) 1, 2   E) Tylko 3

14. Jeśli powstały obraz radiologiczny jest skrócony, mówimy, że jest:

- A) izometryczny.
- B) hipometryczny.
- C) hipermetryczny.
- D) Prawidłowe są odpowiedzi A + B.
- E) Prawidłowe są odpowiedzi A + C.

15. Kiedy stosowana jest technika wykonywania małoformatowych zdjęć wewnątrzustnych według LeMastera?

- A) U pacjentów z płytkim podniebieniem.
- B) W celu ominięcia cienia rzucanego przez kość jarzmową.

- C) U pacjentów z długim wyrostkiem rylcowatym.
- D) Prawidłowe są odpowiedzi A + B.
- E) Prawidłowe są odpowiedzi A + B + C.

■ 16. Wybierz spośród poniższych wady techniki izometrii Cieszyńskiego.

- 1) Konieczność użycia trzymadełek i ich sterylizacji.
- 2) Wygodne ustawienie kliszy w jamie ustnej.
- 3) Trudność w utrzymaniu ortoradialności.
- 4) Częściowe nienaświetlenie filmu.

A) 1, 3   B) 2, 3, 4   C) 1, 3   D) 1, 2, 4   E) 3, 4

■ 17. Do oceny położenia korzeni zęba w stosunku do dna zatoki szczękowej na zdjęciu radiologicznym można wykorzystać technikę pomocniczą według:

- A) Parmy.
- B) Petersona.
- C) Mloska.
- D) LeMastera.
- E) Cieszyńskiego.

■ 18. Ile wynosi dawka promieniowania w przypadku wykonania u pacjenta zdjęcia RVG?

- A) 2–5 mikroSv.
- B) 20–25 mikroSv.
- C) 55–72 mikroSv.
- D) 100–120 mikroSv.
- E) 210–220 mikroSv.